

EQS DIFERENCIAIS PARCIAIS I- SETEMBRO de 2003–Lista 4

Professor: Ricardo Sá Earp

Fatores integrantes, teorema de Frobenius

Equações integráveis (exatas) da forma:

$$P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz = 0$$

- 1) Sejam $P(x, y)$ e $Q(x, y)$ funções de classe C^1 definidas num aberto U de \mathbb{R}^2 . Considere a equação

$$(*) \quad P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

- a) Mostre que $(*)$ admite um fator integrante, i.e $(*)$ é integrável.
b) Sejam μ e λ dois fatores integrantes de cujo quociente não se reduz a uma constante. Mostre que $F(x, y) = \frac{\lambda(x, y)}{\mu(x, y)} = c, c \in \mathbb{R}$, dá uma solução geral de $(*)$.
c) Estabeleça condições suficientes para que $(*)$ admita um fator integrante que dependa apenas de uma variável (ou bem x ou bem y). Idem para a existência de um fator integrante da forma $\mu = f(x + y)$.

- i) Integre a equação

$$(5x^2 + 2xy + 3y^3) + 3(x^2 + xy^2 + 2y^3)y' = 0$$

- ii) Encontre a solução geral da equação

$$(2x^2 + 2xy^2 + 1)y dx + (3y^2 + x) dy = 0$$

- iii) Integre a equação

$$2(1 + y^2) dx + x(1 + y^2) dy = 0$$

iv) Admitindo que x é fator integrante da equação

$$(x + y) dx + \alpha(x) dy = 0$$

encontre α satisfazendo $\alpha(1) = 1$ de modo que a equação seja exata.

Integre a equação.

d) Considere a equação

$$(y^2/2 - 2ye^x) dx + (y - e^x) dy = 0$$

i) Obtenha um fator integrante da equação.

ii) Obtenha a solução geral da equação

iii) Obtenha a expressão geral dos fatores integrantes da equação.

e) Estude como obter um fator integrante para a equação

$$(A(x, y) dx + B(x, y) dy) + (C(x, y) dx + D(x, y) dy) = 0$$

i) Encontre um fator integrante para a equação

$$ay dx + bx dy + x^m y^n (\alpha y dx + \beta x dy) = 0$$

onde $a, b, \alpha, \beta, m, n$ são constantes.

f) Considere

$$(yx^2 + y^3 - xy) dx + x^2 dy = 0$$

i) Mostre que fazendo uma escolha adequada de um fator integrante a equação obtida após uma mudança de variável é uma equação de Bernoulli.

ii) Integre a equação.

iii) Determine todos os fatores integrantes da equação.

g) Resolva a equação

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{x^2 y^2 + y^5}$$

2) Estabeleça a condição de integrabilidade da equação

$$(*) \quad dz = P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy$$

onde P e Q são funções de classe C^1 num aberto U de \mathbb{R}^3 .

a) Integre a equação

$$p = \frac{2x + z^2 - x^2 - 2y^2}{2z}, \quad q = \frac{4y + z^2 - x^2 - 2y^2}{2z}$$

O método de Mayer consiste em integrar (*) no plano vertical $y - y_0 = m(x - x_0)$, onde $m \in \mathbb{R}$ e $dy = m dx$. Aplique o método para integrar

b)

$$dz = \frac{(x^2 + 2x(y + z) - y^2 - z^2) dx + (y^2 + 2y(x + z) - x^2 - z^2) dy}{x^2 + y^2 - 2z(x + y) - z^2}$$

3) A finalidade deste exercício é integrar a E.D.P. quasilinear

$$(*) \quad M(x, y, u)u_x = N(x, y, u)u_y$$

onde M e N são funções de classe C^1 num aberto U de \mathbb{R}^3 .

a) Tome u como parâmetro e estabeleça a condição de integrabilidade da equação

$$(**) \quad M dy + N dx = 0$$

b) Assuma que $\psi(x, y, u) = 0$ é solução de (**) satisfazendo $\psi_u \neq 0$. Encontre uma fórmula para ψ e mostre que a função $u(x, y)$ determinada implicitamente satisfaz a equação (*).

i) Seja

$$yu_x = xuu_y$$

Determine $\psi(x, y, u) = 0$, e encontre soluções particulares da equação.

4) Verifique se as 1-formas diferenciais abaixo ω são exatas ou integráveis encontrando as superfícies integrais.

a)

$$\omega = yz dx + 2xz dy - 3xy dz = 0$$

b)

$$\omega = (6x + yz) dx + (xz - 2y) dy + (xy + 2z) dz = 0$$

c)

$$\omega = (2x + y^2 + 2xz) dx + 2xy dy + x^2 dz = 0$$

d)

$$\omega = 2xz dx - 2yz dy - (x^2 - y^2) dz = 0$$

e)

$$\omega = y(x^2 - y^2 - xy) dx + x(y^2 - x^2 - xz) dy + xy(x + y) dz = 0$$

Determine um fator integrante.

f)

$$(yz + z^2) dx - xz dy + xy dz = 0$$

g)

$$2x dx + dy + (1 + 2z^2 + 2yz + 2x^2 z) dz = 0$$

h) Diferenciando verifique suas respostas aos itens a) – g).

i) Considere

$$(*) \quad y(y^2 - x) dx + x^2 dy = 0$$

i_1) Mostre que a equação (*) é invariante pela transformação (uma família a 1-parâmetro)

$$\begin{cases} y' = e^{\epsilon/2} y \\ x' = e^{\epsilon} x \end{cases}$$

i_2) Considere o operador infinitesimal do grupo dado por

$\{\eta = \frac{y}{2}, \quad \xi = x\}$. Mostre que a equação (*) admite um fator integrante da forma $\lambda(x, y) = \frac{1}{N\eta - M\xi}$, onde $M = y(y^2 - x)$ e $N = x^2$.

Integre.

j) Mostre que se a equação

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

é homogênea e $Mx + Ny \neq 0$, então um fator integrante está dado por $\lambda(x, y) = \frac{1}{Mx + Ny}$. Aplique isto encontrando primeiro um fator integrante da equação seguinte antes de resolvê-la

$$(xy - 2y^2) dx - (x^2 - 3xy) dy = 0$$

- k) Mostre que $f(x + iy) := M + iN$ é holomorfa então um fator integrante de

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

pode ser obtido da forma $\lambda = \frac{1}{M^2 + N^2}$. Usando isto integre

$$(y^2 + 2xy - x^2) dy - (y^2 - 2xy - x^2) dx = 0$$

- 5) Determine $f(x, y)$ de modo que a 1-forma diferencial abaixo ω

$$\omega = (yz - y^3) dx + (xy^2 + xz) dy + f(x, y) dz = 0$$

seja integrável, encontrando as superfícies integrais.

6)

- a) Determine o campo de planos de dimensão 2 em $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ dado pelas 1-formas diferenciais abaixo

i)

$$\omega = x dx + y dy + z dz = 0$$

ii)

$$\omega = x dx + y dy - z dz = 0$$

- b) Determine se as 1-formas do item a) são integráveis e obtenha as superfícies integrais. Use o MAPLE para exibir um gráfico que desenhe as folheações determinadas .
- c) Faça um estudo análogo ao que foi feito nos itens a)b) com respeito a 1-forma diferencial em $\mathbb{R}^3 \setminus \text{eixo } z$ dada por

$$\omega = y dx - 2x dy$$

- d) Determine as singularidades das folheações em \mathbb{R}^3 dadas nos itens a, b, c.
- e) Exiba outros exemplos interessantes de folheações de \mathbb{R}^3 , exibindo os gráficos via o MAPLE.
- f) Generalize o que foi feito anteriormente e obtenha folheações de codimensão 1 em R^n .

* * *

Vamos olhar para certos aspectos do teorema de Frobenius. Consulte as referências 2, 4, 6, 7, 11 e 13 para obter um maior aprofundamento deste importante resultado.

Seja $X = \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ e $Y = \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ campos de classe C^1 definidos num aberto U de \mathbb{R}^n . O colchete de Lie de X e Y está definido por

$$[X, Y] := \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \left(a_j \frac{\partial b_i}{\partial x_j} - b_j \frac{\partial a_i}{\partial x_j} \right) \right) \frac{\partial}{\partial x_i}$$

Dizemos que uma distribuição \mathcal{P} de k -planos de classe C^1 em \mathbb{R}^n é integrável se existe uma folheação \mathcal{F} de dimensão k tangente a \mathcal{P} . Um fato é que uma distribuição de k planos pode ser definida localmente como sendo o núcleo de $n - k$ formas independentes, ou seja dada pelas equações $\omega_{k+1} = 0, \dots, \omega_n = 0$, onde $\omega_{k+1}, \dots, \omega_n$, são 1-formas de classe C^1 linearmente independentes.

Sabemos que \mathcal{P} é integrável se e somente se

$$d\omega_j \wedge \omega_{k+1} \wedge \dots \wedge \omega_n = 0, \quad j = k+1, \dots, n$$

Dizemos que \mathcal{P} é involutivo se dados campos X e Y tangentes a \mathcal{P} então o colchete $[X, Y]$ também é tangente a \mathcal{P} .

A versão geométrica do teorema de Frobenius diz que \mathcal{P} é integrável se e somente se é involutivo.

Uma outra maneira de ver o Teorema de Frobenius é via a equivalência: \mathcal{P} é integrável, se e somente se o ideal \mathcal{I} das formas diferenciais que anulam a distribuição \mathcal{P} é fechado com respeito a diferenciação exterior, i.e $d(\mathcal{I}) \subset \mathcal{I}$. Diz-se que neste caso \mathcal{I} é um ideal diferencial.

7) Conservando as definições, convenções e notações acima:

a) Seja Ω uma 2-forma diferencial num aberto U tal que

$$\Omega \wedge \omega_{k+1} \wedge \dots \wedge \omega_n = 0$$

Mostre que localmente existem 1-formas diferenciais $\alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n$ tal que

$$\Omega = \alpha_{k+1} \wedge \omega_{k+1} + \dots + \alpha_n \wedge \omega_n$$

b) Mostre que

$$d\omega_j(X, Y) = Y\omega_j(X) - X\omega_j(Y) + \omega_j([X, Y])$$

c) Assuma que \mathcal{P} é integrável. Mostre que \mathcal{P} é involutivo e vice-versa.

8) Sejam $A(x, y, x, u)$, $B(x, y, z, u)$ e $C(x, y, z, u)$ funções de classe C^1 definidas num aberto de \mathbb{R}^4 . Estabeleça a condição de integrabilidade da equação

$$du = A(x, y, x, u) dx + B(x, y, x, u) dy + C(x, y, z, u) dz$$

9) Sejam $A(x, y, z)$, $B(x, y, z)$ e $C(x, y, z)$ funções de classe C^1 definidas num aberto de \mathbb{R}^3 . Determine a condição de integrabilidade do sistema

$$\begin{cases} \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = A \\ \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = B \\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = C \end{cases}$$

10) Considere $U_k(u, v, x_1, \dots, x_n)$ e $V_k(u, v, x_1, \dots, x_n)$ duas funções suaves localmente. Estabeleça a condição de integrabilidade do sistema

$$\begin{cases} \frac{\partial x_k}{\partial u} = U_k(u, v, x_1, \dots, x_n) \\ \frac{\partial x_k}{\partial v} = V_k(u, v, x_1, \dots, x_n), \quad k = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

Nota: O resultado acima pode ser utilizado para demonstrar o teorema fundamental da Geometria Diferencial: As equações de compatibilidade Gauss e Codazzi-Mainardi são as equações de integrabilidade para se construir imersões isométricas em \mathbb{R}^3 , mas geralmente nos espaços de formas espaciais. Consulte as referências 6, 10.

BIBLIOGRAFIA

1. T. Amaranath. *Partial differential equations*. Segunda edição. Alpha Science, England, 2003.

2. César Camacho & Alcides Lins Neto. *Teoria geométrica das folheações*. Projeto Euclides, 1979.
3. Manfredo P. do Carmo. *Differential forms and applications*. Springer, 1994.
4. Henri Cartan. *Cours de calcul différentiel*. Hermann, Paris, 1967.
5. Lawrence C. Evans. *Partial differential equations*. AMS, 1998
6. Noel J. Hicks. *Notes in differential geometry*. Van Nostrand, 1965
7. Serge Lang. *Differential manifolds*. Springer, 1971.
8. A. Martin. *Equations aux dérivées partielles*. Dunod, Paris, 1991.
9. Jorge Sotomayor. *Lições de equações diferenciais ordinárias*. Projeto Euclides, 1979.
10. J. J. Stoker. *Differential Geometry*. Wiley- interscience, 1969.
11. Philippe Tondeur. *Foliations on Riemannian Manifolds* Springer, 1988.
12. Georges Valiron. *Équations fonctionnelles*. J. Gabay, 1989.
13. Frank W. Warner. *Foundations of differential manifolds and Lie Groups*. Springer, 1983.
14. Daniel Zwillinger. *Handbook of differential equations*. Segunda edição, Academic Press, 1992.