

# INTROD. VCOMPLEXAS- AGOSTO DE 2006–Lista7

Professor: Ricardo Sá Earp

## PARTE A: FUNÇÕES ANALÍTICAS ELEMENTARES

1) Mostre que se  $0 < a < 1$ , então

$$2\pi i e^{i\pi a} / (e^{2\pi a i} - 1) = \frac{\pi}{\sin a\pi}$$

Para que valores  $a \in \mathbb{C}$  a igualdade acima é verdadeira ?

2) Mostre que se  $q = e^{i\pi\tau}$ ,  $\text{Im } \tau > 0$  e se  $\theta = e^{i\pi u}$ , então

$$\frac{\sin \pi(n\tau - u) \cdot \sin \pi(n\tau + u)}{\sin^2(\pi n\tau)} = \frac{(1 - q^{2n}\theta^{-2})(1 - q^{2n}\theta^2)}{(1 - q^{2n})^2}$$

3) Seja

$$f(z) = a \operatorname{sen} z - e^z, \quad z \in \Omega := \{z; |\Re z| \leq \pi/2, \quad |\operatorname{Im} z| \leq \pi/2\}$$

a) Calcule

$$\max_{\partial\Omega} |f(z)|$$

Será que  $\max_{\Omega} |f(z)| = \max_{\partial\Omega} |f(z)|$  ?

4) Mostre que a função  $w = e^{1/z^k}$ ,  $k \in \mathbb{N}^*$  em qualquer disco perfurado da origem, toma todos os valores complexos  $w$  uma infinidade de vezes, exceto  $w = 0$ . Idem para  $w = \sin(1/z)$ . **Nota cultural matemática:** relacione com o grande teorema de Picard.

5) Seja  $f(z) = \exp(az) + \exp(bz)$ , onde  $a, b$  são constantes complexas e  $z \in \mathbb{C}$ . Mostre que  $f$  é periódica  $\Leftrightarrow a = b = 0$  ou  $b = ra$ , onde  $r$  é um número real racional.

6) Mostre que

a)  $|\exp z^2| \rightarrow \infty$  se  $|z| \rightarrow \infty$ ,  $|\arg z| \leq \alpha < \pi/4$ .

b)  $\cos z$  é real  $\Leftrightarrow y = 0$  ou  $x = n\pi$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .

- c)  $\sin z$  é imaginário puro  $\Leftrightarrow x = n\pi$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .
- d)  $\exp((1+i)z) = \sum_{n \geq 0} 2^{n/2} \exp\left(\frac{in\pi}{4}\right) \frac{z^n}{n!}$ ,  $\forall z \in \mathbb{C}$ .
- e)  $\exp(\cos z) \cos(\sin z) = \sum_{n \geq 0} \frac{\cos nz}{n!}$ ,  $\forall z \in \mathbb{C}$ . *Sugestão:* Verifique que

$$\exp(\exp \pm iz) = \sum_n \frac{\exp(\pm inz)}{n!} = \sum_n \frac{\cos nz}{n!} \pm \sum_n i \frac{\sin nz}{n!}$$

e que  $\exp(\exp \pm iz) = \exp(\cos z) \exp(\pm i \sin z)$ .

- f)  $\cos i + i \sin i = e^{-1}$ .
- g)  $\log \exp(1 + 4i) = 1 + (4 - 2\pi)i$ .
- h)  $\forall z \in \mathbb{C}$ ,  $|\cos z| \leq \cosh |z|$  e que  $|\sin z| \leq \sinh |z|$ . Deduza que para  $|z| < 1$ ,  $|\cos z| < 2$  e  $|\sin z| \leq 6|z|/5$ .
- 7) Verificar que  $\cos z = w$ , implica que

$$z = -i \log \left( w \pm \sqrt{w^2 - 1} \right) + 2n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Em particular, concluir que  $\cos : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  é sobrejetiva.

- 8) Verificar que  $\sin z = w$ , implica que

$$z = -i \log \left( iw \pm \sqrt{1 - w^2} \right) + 2n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Em particular, concluir que  $\sin : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  é sobrejetiva.

- 9) Verificar todas as determinações de
- $2^i$ . *Resposta:*  $e^{-2n\pi} \{ \cos(\log 2) + i \sin(\log 2) \}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .
  - $i^i$ . *Resposta:*  $\exp \left\{ -\pi \left( 2n + \frac{1}{2} \right) \right\}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .
- 10) Encontrar todos os números  $a$  e  $z$  complexos tais que:
- Toda determinação de  $a^z$  são reais.
  - Toda determinação de  $a^z$  seja de valor absoluto 1. *Sugestão:* Seja  $z = x + iy$ ,  $x, y$  reais e  $a = re^{i\theta}$ ,  $r > 0$ ,  $\theta \in (-\pi, \pi]$ .
- 11) Sejam  $\alpha = a + ib$ ,  $a, b$  reais e  $z \in \mathbb{C}^*$ . Verifique que

$$|z^\alpha| = |z|^a e^{-b \arg z}$$

deduza que

- a)  $\lim_{z \rightarrow 0} |z^\alpha| = 0 \Leftrightarrow \Re \alpha > 0$ .  
 b)  $\lim_{z \rightarrow 0} |z^\alpha| = \infty \Leftrightarrow \Re \alpha < 0$ .

12) Verificar que, se  $|z| < 1$ ,

$$\frac{1}{2} + z + z^2 + \dots = \frac{1}{2} \cdot \frac{1+z}{1-z}$$

colocando  $z = re^{i\theta}$ ,  $0 \leq r < 1$ , deduza:

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos n\theta = \frac{1}{2} \frac{1-r^2}{1+r^2-2r \cos \theta}$$

deduza ainda fórmula análoga trocando-se cos por sin na expressão a esquerda da igualdade.

- 13) Seja  $z = x + iy$ , com  $x, y$  reais. Verifique que  $|\sin nz| \leq e^{n|y|}$ ,  $n = 1, 2, \dots$ ; deduza que  $\sum_{n \geq 1} 2^{-n} \sin nz$  converge absolutamente se  $|\operatorname{Im} z| < \log 2$ . Por outro lado se  $|\operatorname{Im} z| \geq \log 2$ , mostre que  $|2^{-n} \sin nz| \not\rightarrow 0$ , quando  $n \rightarrow \infty$  (veja o exercício seguinte), de modo que  $\sum_{n \geq 1} 2^{-n} \sin nz$  diverge se  $|\operatorname{Im} z| \geq \log 2$ .
- 14) Mostrar que a série  $\sum_{n \geq 1} n^{-2} \sin nz$  converge apenas para  $z$  real, mostrando que

$$|\sin nz| \geq \frac{1}{2} \left( e^{n|y|} - e^{-n|y|} \right), \quad y = \operatorname{Im} z.$$

15) Considere a série

$$(*) \quad f(z) = \sum_0^{\infty} \frac{z^{3n}}{(3n)!}$$

- a) Mostre que  $f$  satisfaz  $f'''(z) - f(z) = 0$ . Mostre ainda que  $f(z) = \frac{1}{3} \left( e^z + 2e^{-z/2} \cos \frac{\sqrt{3}z}{2} \right)$ .
- i) Deduza, partindo da série (\*), trocando  $z$  por  $-z$  e somando que

$$\frac{1}{3} \left( \cosh z + 2 \cosh z/2 \cos(\sqrt{3}z/2) \right) = \sum_0^{\infty} \frac{z^{6n}}{(6n)!}$$

16) Mostrar que

$$\log \left( \frac{1+z}{1-z} \right) = \log(1+z) - \log(1-z) \quad \text{se } z \notin E = \{t \in \mathbb{R}; |t| \geq 1\}$$

*Sugestão:* Verifique que as duas funções são holomorfas em  $\mathbb{C} \setminus E$  e que a igualdade é verificada para  $z \in \mathbb{R}$  e  $|z| < 1$ .

17) Seja

$$f(z) = \frac{1}{2i} \log \left( \frac{1+iz}{1-iz} \right)$$

Verificar que  $f$  é holomorfa em  $\mathbb{C} \setminus F$ , onde  $F = \{it, t \in \mathbb{R}, |t| > 1\}$ . De acordo com o item anterior conclua que

$$f(z) = \frac{1}{2i} \log(1+iz) - \log(1-iz) \quad \text{se } z \notin F$$

Concluir que  $f(z)$  é um prolongamento analítico da função  $f$  dada por

$$f(z) = z - \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} - \dots = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{2n+1}, \quad |z| < 1$$

Deduzir que para  $t$  real em  $(-1, 1)$ ,  $f(t) = \arctan t$ . Conclua que  $\tan(f(z)) = z$ ,  $z \in \mathbb{C} \setminus F$ .  $f(z)$  é o ramo principal de  $\arctan z$ .

18) Verifique (ou obtenha) os desenvolvimentos de Taylor das funções abaixo, justificando a convergência (raio e disco de convergência) em cada caso.

- a) Este exercício é para ser feito por dois métodos. Obtenha via o método do produto de séries (relação de recorrência entre os coeficientes) e também pelo método das frações parciais o seguinte:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-2z \cos \theta + z^2} &= \sum_0^{\infty} \frac{e^{(n+1)i\theta} - e^{-(n+1)i\theta}}{e^{i\theta} - e^{-i\theta}} z^n \\ &= \frac{1}{\sin \theta} \sum_0^{\infty} z^n \sin(n+1)\theta, \quad |z| < 1 \end{aligned}$$

- b) Exiba as séries abaixo escrevendo uma expressão numa “forma fechada” ( $s \in \mathbb{R}$ )

$$\begin{aligned} &\sum_{n \geq 0} z^n \cos ns \\ &\sum_{n \geq 0} z^n \sin ns \end{aligned}$$

19) Deduza que

$$\sum_1^{\infty} \frac{z^n}{n} \cos n\theta = -\frac{1}{2} \ln(1 - 2z \cos \theta + z^2), \quad |z| < 1,$$

onde  $w = \ln z$  denota o ramo principal do logaritmo.

\*            \*            \*

***Nota cultural matemática***

- Considere a *série binomial*

$$b_{\sigma}(z) := \sum_0^{\infty} \binom{\sigma}{n} z^n$$

onde

$$\binom{\sigma}{0} := 1 \quad \binom{\sigma}{n} := \frac{\sigma(\sigma-1)\cdots(\sigma-n+1)}{n!}$$

ou seja

$$b_{\sigma}(z) = 1 + \sigma z + \frac{\sigma(\sigma-1)}{2} z^2 + \cdots$$

Note que  $b_{\sigma}$  é holomorfa na bola unitária aberta centrada na origem, já que o raio de convergência da série que define  $b_{\sigma}$  é igual a 1. Note que  $b_{-1} = \frac{1}{1+z}$ ,  $|z| < 1$ .

Vale a fórmula de multiplicação :

$$(1+z)b_{\sigma-1} = b_{\sigma}$$

Infere-se que

$$b'_{\sigma}(z) = \sigma b_{\sigma}/(1+z)$$

Seja  $\lambda(z) := \sum_1^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} z^n}{n}$ . Note que

$$b_{\sigma}(z) = e^{\sigma\lambda(z)}, \quad |z| < 1$$

Vale a fórmula de Abel-Newton

$$(1+z)^{\sigma} = \sum_0^{\infty} \binom{\sigma}{n} z^n, \quad \forall \sigma \in \mathbb{C}, \quad |z| < 1.$$