

INTROD. VCOMPLEXAS- AGOSTO DE 2004–ListaF

Professor: Ricardo Sá Earp

PARTE A: FUNÇÕES ANALÍTICAS ELEMENTARES

1) Mostre que se $0 < a < 1$, então

$$2\pi i e^{i\pi a} / (e^{2\pi a i} - 1) = \frac{\pi}{\sin a\pi}$$

Para que valores $a \in \mathbb{C}$ a igualdade acima é verdadeira ?

2) Mostre que se $q = e^{i\pi\tau}$, $\text{Im } \tau > 0$ e se $\theta = e^{i\pi u}$, então

$$\frac{\sin \pi(n\tau - u) \cdot \sin \pi(n\tau + u)}{\sin^2(\pi n\tau)} = \frac{(1 - q^{2n}\theta^{-2})(1 - q^{2n}\theta^2)}{(1 - q^{2n})^2}$$

3) Seja

$$f(z) = a \operatorname{sen} z - e^z, \quad z \in \Omega := \{z; |\Re z| \leq \pi/2, \quad |\operatorname{Im} z| \leq \pi/2\}$$

a) Calcule

$$\max_{\partial\Omega} |f(z)|$$

Será que $\max_{\Omega} |f(z)| = \max_{\partial\Omega} |f(z)|$?

4) Mostre que a função $w = e^{1/z^k}$, $k \in \mathbb{N}^*$ em qualquer disco perfurado da origem, toma todos os valores complexos w uma infinidade de vezes, exceto $w = 0$. Idem para $w = \sin(1/z)$. **Nota cultural matemática:** relacione com o *grande teorema de Picard*.

5) Seja $f(z) = \exp(az) + \exp(bz)$, onde a, b são constantes complexas e $z \in \mathbb{C}$. Mostre que f é periódica $\Leftrightarrow a = b = 0$ ou $b = ra$, onde r é um número real racional.

6) Mostre que

a) $|\exp z^2| \rightarrow \infty$ se $|z| \rightarrow \infty$, $|\arg z| \leq \alpha < \pi/4$.

b) $\cos z$ é real $\Leftrightarrow y = 0$ ou $x = n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$.

- c) $\sin z$ é imaginário puro $\Leftrightarrow x = n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$.
- d) $\exp((1+i)z) = \sum_{n \geq 0} 2^{n/2} \exp\left(\frac{in\pi}{4}\right) \frac{z^n}{n!}$, $\forall z \in \mathbb{C}$.
- e) $\exp(\cos z) \cos(\sin z) = \sum_{n \geq 0} \frac{\cos nz}{n!}$, $\forall z \in \mathbb{C}$. *Sugestão:* Verifique que

$$\exp(\exp \pm iz) = \sum_n \frac{\exp(\pm in z)}{n!} = \sum_n \frac{\cos nz}{n!} \pm \sum_n i \frac{\sin nz}{n!}$$

e que $\exp(\exp \pm iz) = \exp(\cos z) \exp(\pm i \sin z)$.

- f) $\cos i + i \sin i = e^{-1}$.
- g) $\log \exp(1 + 4i) = 1 + (4 - 2\pi)i$.
- h) $\forall z \in \mathbb{C}$, $|\cos z| \leq \cosh |z|$ e que $|\sin z| \leq \sinh |z|$. Deduza que para $|z| < 1$, $|\cos z| < 2$ e $|\sin z| \leq 6|z|/5$.
- 7)
- a) Seja $f \in H(\mathbb{C})$ uma função inteira tal que $f(0) = 1$. Mostre que se $f(z+w) = f(z)f(w)$, $\forall z, w \in \mathbb{C}$; então $f(z) = e^{\alpha z}$, $\forall z \in \mathbb{C}$, $\alpha \in \mathbb{C}$.
- b) Seja f uma função contínua tal que

$$f(z+w) = f(z) + f(w), \quad z, w \in \mathbb{C}.$$

Mostre que

$$f(z) = az + b\bar{z}, \quad z \in \mathbb{C}, \text{ para } a, b \in \mathbb{C}.$$

- 8) Verificar que $\cos z = w$, implica que

$$z = -i \log \left(w \pm \sqrt{w^2 - 1} \right) + 2n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Em particular, concluir que $\cos : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ é sobrejetiva.

- 9) Verificar que $\sin z = w$, implica que

$$z = -i \log \left(iw \pm \sqrt{1 - w^2} \right) + 2n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Em particular, concluir que $\sin : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ é sobrejetiva.

- 10) Verificar todas as determinações de

a) 2^i . *Resposta:* $e^{-2n\pi} \{ \cos(\log 2) + i \sin(\log 2) \}$, $n \in \mathbb{Z}$.

b) i^i . *Resposta:* $\exp\left\{-\pi\left(2n + \frac{1}{2}\right)\right\}$, $n \in \mathbb{Z}$.

11) Encontrar todos os números a e z complexos tais que:

a) Toda determinação de a^z são reais.

b) Toda determinação de a^z seja de valor absoluto 1. *Sugestão:* Seja $z = x + iy$, x, y reais e $a = re^{i\theta}$, $r > 0$, $\theta \in (-\pi, \pi]$.

12) Sejam $\alpha = a + ib$, a, b reais e $z \in \mathbb{C}^*$. Verifique que

$$|z^\alpha| = |z|^a e^{-b \arg z}$$

deduza que

a) $\lim_{z \rightarrow 0} |z^\alpha| = 0 \Leftrightarrow \Re \alpha > 0$.

b) $\lim_{z \rightarrow 0} |z^\alpha| = \infty \Leftrightarrow \Re \alpha < 0$.

13) Verificar que, se $|z| < 1$,

$$\frac{1}{2} + z + z^2 + \dots = \frac{1}{2} \cdot \frac{1+z}{1-z}$$

colocando $z = re^{i\theta}$, $0 \leq r < 1$, deduza:

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos n\theta = \frac{1}{2} \frac{1-r^2}{1+r^2-2r \cos \theta}$$

deduza ainda fórmula análoga trocando-se \cos por \sin na expressão a esquerda da igualdade.

14) Seja $z = x + iy$, com x, y reais. Verifique que $|\sin nz| \leq e^{n|y|}$, $n = 1, 2, \dots$; deduza que $\sum_{n \geq 1} 2^{-n} \sin nz$ converge absolutamente se $|\operatorname{Im} z| < \log 2$. Por outro lado se $|\operatorname{Im} z| \geq \log 2$, mostre que $|2^{-n} \sin nz| \not\rightarrow 0$, quando $n \rightarrow \infty$ (veja o exercício seguinte), de modo que $\sum_{n \geq 1} 2^{-n} \sin nz$ diverge se $|\operatorname{Im} z| \geq \log 2$.

15) Mostrar que a série $\sum_{n \geq 1} n^{-2} \sin nz$ converge apenas para z real, mostrando que

$$|\sin nz| \geq \frac{1}{2} \left(e^{n|y|} - e^{-n|y|} \right), \quad y = \operatorname{Im} z.$$

16) Mostre que não existe nenhuma função contínua

$$f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^* \quad \text{talque} \quad (f(z))^2 = z, \quad \forall z \in \mathbb{C}^*.$$

Sugestão: Observe que $f(z) \neq 0, \forall z \in \mathbb{C}^*$. Passando a $-f$ se necessário, suponha que $f(1) = 1$. Mostre que a função $z \rightarrow f(z)f(w)/f(zw)$ é contínua e identicamente igual a 1. Infira daí uma contradição.

Mostre que não existe nenhum ramo contínuo de $z^{1/2}$ em \mathbb{C}^* , por outro lado $z \rightarrow z^{1/2}$ é holomorfa em $\mathbb{C} - (-\infty, 0]$.

Conclua também que não existe nenhuma função logaritmo no domínio \mathbb{C}^* .

17) As séries de Taylor de $\frac{z}{e^z - 1}$, $\cot z$ e $\tan z$.

a) A série de Taylor de $\frac{z}{e^z - 1}$ em torno da origem está definida por

$$\frac{z}{e^z - 1} = \sum_0^{\infty} \frac{B_k}{k!} z^k, \quad B_k \in \mathbb{C}$$

Mostre as seguintes afirmações

i) $B_1 = 0$ e $B_{2k+1} = 0$ para $k \geq 1$.

ii)

$$\binom{n}{0} B_0 + \binom{n}{1} B_1 + \binom{n}{2} B_2 + \dots + \binom{n}{n-1} B_{n-1} = 0$$

Os números acima são chamados de *números de Bernouille* (veja listaD)

Sugestão: Considere $1 = \frac{e^z - 1}{z} \cdot \frac{z}{e^z - 1}$.

b) Mostre que

$$\cot z = \frac{1}{z} + \sum_1^{\infty} (-1)^k \frac{4^k}{(2k)!} B_{2k} z^{2k-1}$$

$$\tan z = \sum_1^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{4^k (4^k - 1)}{(2k)!} B_{2k} z^{2k-1}$$

Discuta o raio de convergência da série de $z \cot z$.

18) Considere a série

$$(*) \quad f(z) = \sum_0^{\infty} \frac{z^{3n}}{(3n)!}$$

a) Mostre que f satisfaz $f'''(z) - f(z) = 0$. Mostre ainda que $f(z) = \frac{1}{3} \left(e^z + 2e^{-z/2} \cos \frac{\sqrt{3}z}{2} \right)$.

i) Deduza, partindo da série (*), trocando z por $-z$ e somando que

$$\frac{1}{3} \left(\cosh z + 2 \cosh z/2 \cos(\sqrt{3}z/2) \right) = \sum_0^{\infty} \frac{z^{6n}}{(6n)!}$$

19) Considere a função $f(z) = \log \frac{1+z}{1-z}$, $|z| < 1$. Calcule $f^{(n)}(0)$, a n -ésima derivada de f na origem. Use obrigatoriamente o desenvolvimento de Taylor de f na origem para calcular, $\log \frac{m}{n}$, $\log 2$ e $\log |\cot z|$.

28) Considere a função $f(z) = \frac{e^{-z}}{1+z}$. Mostre que a n -ésima derivada de f na origem é dada por $f^{(n)}(0) = (-1)^n n! \left(1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right)$.

20) Mostrar que

$$\log \left(\frac{1+z}{1-z} \right) = \log(1+z) - \log(1-z) \quad \text{se } z \notin E = \{t \in \mathbb{R}; |t| \geq 1\}$$

Sugestão: Verifique que as duas funções são holomorfas em $\mathbb{C} \setminus E$ e que a igualdade é verificada para $z \in \mathbb{R}$ e $|z| < 1$.

21) Seja

$$f(z) = \frac{1}{2i} \log \left(\frac{1+iz}{1-iz} \right)$$

Verificar que f é holomorfa em $\mathbb{C} \setminus F$, onde $F = \{it, t \in \mathbb{R}, |t| > 1\}$. De acordo com o item anterior conclua que

$$f(z) = \frac{1}{2i} \log(1+iz) - \log(1-iz) \quad \text{se } z \notin F$$

Concluir que $f(z)$ é um prolongamento analítico da função f dada por

$$f(z) = z - \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} - \dots = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{2n+1}, \quad |z| < 1$$

Deduzir que para t real em $(-1, 1)$, $f(t) = \arctan t$. Conclua que $\tan(f(z)) = z$, $z \in \mathbb{C} \setminus F$ (cf. exercício 12 Parte A, Lista 3). $f(z)$ é o ramo principal de $\arctan z$.

22) Considere a série

$$f(z) := \sum_0^{\infty} \frac{z^n}{(n+1)(n+2)(n+3)}$$

- a) Mostre que $f(z)$ é analítica no disco aberto $|z| < 1$.
- b) Mostre que $\frac{d}{dz} [z^2 (zf(z))']$ pode ser escrita em termos de funções analíticas elementares no anel $0 < |z| < 1$. Daí escreva $f(z)$ explicitamente usando funções conhecidas.
- 23) Verifique (ou obtenha) os desenvolvimentos de Taylor das funções abaixo, justificando a convergência (raio e disco de convergência) em cada caso. Discuta convergência normal.
- a) Este exercício é para ser feito por dois métodos. Obtenha via o método do produto de séries (relação de recorrência entre os coeficientes) e também pelo método das frações parciais o seguinte:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 - 2z \cos \theta + z^2} &= \sum_0^{\infty} \frac{e^{(n+1)i\theta} - e^{-(n+1)i\theta}}{e^{i\theta} - e^{-i\theta}} z^n \\ &= \frac{1}{\sin \theta} \sum_0^{\infty} z^n \sin(n+1)\theta, \quad |z| < 1 \end{aligned}$$

- b) Exiba as séries abaixo escrevendo uma expressão numa “forma fechada” ($s \in \mathbb{R}$)

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq 0} z^n \cos ns \\ \sum_{n \geq 0} z^n \sin ns \end{aligned}$$

- c) Exiba o desenvolvimento de Taylor na origem das funções $f(z)$ abaixo, determinando o raio de convergência das respectivas séries

$$\begin{aligned} f(z) &= \ln(1 + z + z^2 + z^3 + z^4) \\ f(z) &= \ln(1 + 2z + 2z^2 + 2z^3 + z^4) \end{aligned}$$

Sugestão: procure fatorar os polinômios envolvidos no argumento do log.

- d) Escreva a série abaixo como soma de duas funções elementares (“closed form”)

$$\sum_0^{\infty} \frac{z^{4n}}{(4n)!}$$

Sugestão: Procure encontrar duas funções conhecidas cuja soma dá a série. Ou ainda, verifique que a série satisfaz uma equação diferencial resolvendo-a.

* * *

Nota cultural matemática

- Considere a série binomial

$$b_\sigma(z) := \sum_0^\infty \binom{\sigma}{n} z^n$$

onde

$$\binom{\sigma}{0} := 1 \quad \binom{\sigma}{n} := \frac{\sigma(\sigma-1)\cdots(\sigma-n+1)}{n!}$$

ou seja

$$b_\sigma(z) = 1 + \sigma z + \frac{\sigma(\sigma-1)}{2} z^2 + \cdots$$

Note que b_σ é holomorfa na bola unitária aberta centrada na origem, já que o raio de convergência da série que define b_σ é igual a 1. Note que $b_{-1} = \frac{1}{1+z}$, $|z| < 1$. Vale a fórmula de multiplicação :

$$(1+z)b_{\sigma-1} = b_\sigma$$

Infere-se que

$$b'_\sigma(z) = \sigma b_\sigma / (1+z)$$

Seja $\lambda(z) := \sum_1^\infty \frac{(-1)^{n-1} z^n}{n}$. Note que

$$b_\sigma(z) = e^{\sigma\lambda(z)}, \quad |z| < 1$$

Vale a fórmula de Abel-Newton

$$(1+z)^\sigma = \sum_0^\infty \binom{\sigma}{n} z^n, \quad \forall \sigma \in \mathbb{C}, \quad |z| < 1.$$