INTROD. VCOMPLEXAS- AGOSTO DE 2004–ListaF

Professor: Ricardo Sá Earp

PARTE A: FUNÇÕES ANALÍTICAS ELEMENTARES

1) Mostre que se $0 < a < 1$, então

$$2\pi i \mathrm{e}^{i\pi a} \;/\; (\mathrm{e}^{2\pi a i} - 1) = \frac{\pi}{\sin a\pi}$$

Para que valores $a \in \mathbb{C}$ a igualdade acima é verdadeira ?

2) Mostre que se $q = \mathrm{e}^{i\pi\tau}$, $\operatorname{Im}\tau > 0$ e se $\theta = \mathrm{e}^{i\pi u}$, então

$$\frac{\sin\pi(n\tau - u)\cdot\sin\pi(n\tau + u)}{\sin^2(\pi n\tau)} = \frac{(1 - q^{2n}\theta^{-2})(1 - q^{2n}\theta^2)}{(1 - q^{2n})^2}$$

3) Seja

$$f(z) = a\,\mathrm{sen}\,\mathrm{z} - \mathrm{e}^{\mathrm{z}}, \qquad \mathrm{z} \in \Omega := \{\mathrm{z};\ |\Re\mathrm{z}| \leqslant \pi/2, \quad |\operatorname{Im}\mathrm{z}| \leqslant \pi/2\}$$

a) Calcule

$$\max_{\partial\Omega} |f(z)|$$

Será que $\max\limits_{\Omega} |f(z)| = \max\limits_{\partial\Omega} |f(z)|$?

4) Mostre que a função $w = \mathrm{e}^{1/z^k}, k \in \mathbb{N}^*$ em qualquer disco perfurado da origem, toma todos os valores complexos w uma infinidade de vezes, exceto $w = 0$. Idem para $w = \sin(1/z)$. ***Nota cultural matemática***: relacione com o *grande teorema de Picard*.

5) Seja $f(z) = \exp(az) + \exp(bz)$, onde a, b são constantes complexas e $z \in \mathbb{C}$. Mostre que f é periódica $\Leftrightarrow$ $a = b = 0$ ou $b = ra$, onde r é um número real racional.

6) Mostre que

a) $|\exp z^2| \to \infty$ se $|z| \to \infty, |\arg z| \leqslant \alpha < \pi/4$.

b) $\cos z$ é real $\Leftrightarrow$ $y = 0$ ou $x = n\pi,\ n \in \mathbb{Z}$.

c) $\sin z$ é imaginário puro $\Leftrightarrow x = n\pi,\ n \in \mathbb{Z}$.

d) $\exp\left((1+i)z\right) = \sum_{n \geqslant 0} 2^{n/2} \exp\left(\frac{in\pi}{4}\right) \frac{z^n}{n!},\ \forall z \in \mathbb{C}$.

e) $\exp(\cos z)\cos(\sin z) = \sum_{n \geqslant 0} \frac{\cos nz}{n!},\ \forall z \in \mathbb{C}$. *Sugestão*: Verifique que

$$\exp(\exp \pm iz) = \sum_n \frac{\exp(\pm inz)}{n!} = \sum_n \frac{\cos nz}{n!} \pm \sum_n i \frac{\sin nz}{n!}$$

e que $\exp(\exp \pm iz) = \exp(\cos z)\exp(\pm i \sin z)$.

f) $\cos i + i \sin i = e^{-1}$.

g) $\log \exp(1+4i) = 1 + (4-2\pi)i$.

h) $\forall z \in \mathbb{C},\ |\cos z| \leqslant \cosh|z|$ e que $|\sin z| \leqslant \sinh|z|$. Deduza que para $|z| < 1, |\cos z| < 2$ e $|\sin z| \leqslant 6|z|/5$.

7)

a) Seja $f \in H(\mathbb{C})$ uma função inteira tal que $f(0) = 1$. Mostre que se $f(z+w) = f(z)f(w),\ \forall z, w \in \mathbb{C}$; então $f(z) = e^{\alpha z},\ \forall z \in \mathbb{C}, \alpha \in \mathbb{C}$.

b) Seja f uma função contínua tal que

$$f(z+w) = f(z) + f(w), \qquad z, w \in \mathbb{C}.$$

Mostre que

$$f(z) = az + b\bar{z}, \qquad z \in \mathbb{C},\ \text{para},\ a, b \in \mathbb{C}.$$

8) Verificar que $\cos z = w$, implica que

$$z = -i \log\left(w \pm \sqrt{w^2 - 1}\right) + 2n\pi,\ n \in \mathbb{Z}.$$

Em particular, concluir que $\cos : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ é sobrejetiva.

9) Verificar que $\sin z = w$, implica que

$$z = -i \log\left(iw \pm \sqrt{1 - w^2}\right) + 2n\pi,\ n \in \mathbb{Z}.$$

Em particular, concluir que $\sin : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ é sobrejetiva.

10) Verificar todas as determinações de

a) 2^i. *Resposta*: $e^{-2n\pi}\{\cos(\log 2) + i \sin(\log 2)\},\ n \in \mathbb{Z}$.

b) i^i. *Resposta*: $\exp\left\{-\pi\left(2n+\frac{1}{2}\right)\right\},\ n\in\mathbb{Z}$.

11) Encontrar todos os números a e z complexos tais que:
   a) Toda determinação de a^z são reais.
   b) Toda determinação de a^z seja de valor absoluto 1. *Sugestão*: Seja $z = x+iy, x, y$ reais e $a = re^{i\theta}, r>0, \theta\in(-\pi,\pi]$.

12) Sejam $\alpha = a+ib,\ a, b$ reais e $z\in\mathbb{C}^*$. Verifique que

$$|z^\alpha| = |z|^a e^{-b\arg z}$$

deduza que
   a) $\lim\limits_{z\to 0}|z^\alpha| = 0 \Leftrightarrow \Re\alpha > 0$.
   b) $\lim\limits_{z\to 0}|z^\alpha| = \infty \Leftrightarrow \Re\alpha < 0$.

13) Verificar que, se $|z|<1$,

$$\frac{1}{2}+z+z^2+\cdots = \frac{1}{2}\cdot\frac{1+z}{1-z}$$

colocando $z = re^{i\theta},\ 0\leqslant r<1$, deduza:

$$\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{\infty} r^n\cos n\theta = \frac{1}{2}\frac{1-r^2}{1+r^2-2r\cos\theta}$$

deduza ainda fórmula análoga trocando-se cos por sin na expressão a esquerda da igualdade.

14) Seja $z = x+iy$, com x, y reais. Verifique que $|\sin nz|\leqslant e^{n|y|},\ n=1,2,\ldots$; deduza que $\sum_{n\geqslant 1}2^{-n}\sin nz$ converge absolutamente se $|\operatorname{Im} z|<\log 2$. Por outro lado se $|\operatorname{Im} z|\geqslant\log 2$, mostre que $|2^{-n}\sin nz|\not\to 0$, quando $n\to\infty$ (veja o exercício seguinte), de modo que $\sum_{n\geqslant 1}2^{-n}\sin nz$ diverge se $|\operatorname{Im} z|\geqslant \log 2$.

15) Mostrar que a série $\sum_{n\geqslant 1}n^{-2}\sin nz$ converge apenas para z real, mostrando que

$$|\sin nz|\geqslant\frac{1}{2}\left(e^{n|y|}-e^{-n|y|}\right),\ y=\operatorname{Im} z.$$

16) Mostre que não existe nenhuma função contínua

$$f:\mathbb{C}^*\to\mathbb{C}^*\qquad\text{talque }\ (f(z))^2 = z,\ \forall z\in\mathbb{C}^*.$$

Sugestão: Observe que $f(z) \neq 0$, $\forall z \in \mathbb{C}^*$. Passando a $-f$ se necessário, suponha que $f(1) = 1$. Mostre que a função $z \to f(z)f(w)/f(zw)$ é continua e identicamente igual a 1. Infira daí uma contradição .

Mostre que não existe nenhum ramo contínuo de $z^{1/2}$ em $\mathbb{C}^*$, por outro lado $z \to z^{1/2}$ é holomorfa em $\mathbb{C} - (-\infty, 0]$.

Conclua também que não existe nenhuma função logaritmo no domínio $\mathbb{C}^*$.

17) As séries de Taylor de $\dfrac{z}{\mathrm{e}^z - 1}$, $\cot z$ e $\tan z$.

a) A série de Taylor de $\dfrac{z}{\mathrm{e}^z - 1}$ em torno da origem está definida por

$$\frac{z}{\mathrm{e}^z - 1} = \sum_0^\infty \frac{B_k}{k!} z^k, \quad B_k \in \mathbb{C}$$

Mostre as seguintes afirmações

i) $B_1 = 0$ e $B_{2k+1} = 0$ para $k \geqslant 1$.

ii)

$$\binom{n}{0} B_0 + \binom{n}{1} B_1 + \binom{n}{2} B_2 + \cdots + \binom{n}{n-1} B_{n-1} = 0$$

Os números acima são chamados de *números de Bernouille* (veja listaD)

Sugestão: Considere $1 = \dfrac{\mathrm{e}^z - 1}{z} \cdot \dfrac{z}{\mathrm{e}^z - 1}$.

b) Mostre que

$$\cot z = \frac{1}{z} + \sum_1^\infty (-1)^k \frac{4^k}{(2k)!} B_{2k} z^{2k-1}$$
$$\tan z = \sum_1^\infty (-1)^{k-1} \frac{4^k (4^k - 1)}{(2k)!} B_{2k} z^{2k-1}$$

Discuta o raio de convergência da série de $z \cot z$.

18) Considere a série

$$(*) \qquad f(z) = \sum_0^\infty \frac{z^{3n}}{(3n)!}$$

a) Mostre que f satisfaz $f'''(z) - f(z) = 0$. Mostre ainda que $f(z) = \dfrac{1}{3}\left(\mathrm{e}^z + 2\,\mathrm{e}^{-z/2} \cos \dfrac{\sqrt{3}z}{2}\right)$.

i) Deduza, partindo da série $(*)$, trocando z por $-z$ e somando que

$$\frac{1}{3}\left(\cosh z + 2\cosh z/2\cos(\sqrt{3}z/2)\right) = \sum_{0}^{\infty}\frac{z^{6n}}{(6n)!}$$

19) Considere a função $f(z) = \log\dfrac{1+z}{1-z}$, $|z| < 1$. Calcule $f^{(n)}(0)$, a n-ésima derivada de f na origem. Use obrigatoriamente o desenvolvimento de Taylor de f na origem para calcular, $\log\dfrac{m}{n}$, $\log 2$ e $\log|\cot z|$.

28) Considere a função $f(z) = \dfrac{\mathrm{e}^{-z}}{1+z}$. Mostre que a n-ésima derivada de f na origem é dada por $f^{(n)}(0) = (-1)^n n!\left(1 + 1 + \dfrac{1}{2!} + \cdots + \dfrac{1}{n!}\right)$.

20) Mostrar que

$$\log\left(\frac{1+z}{1-z}\right) = \log(1+z) - \log(1-z) \qquad \text{se } z \notin E = \{t \in \mathbb{R};\ |t| \geqslant 1\}$$

Sugestão: Verifique que as duas funções são holomorfas em $\mathbb{C}\setminus E$ e que a igualdade é verificada para $z \in \mathbb{R}$ e $|z| < 1$.

21) Seja

$$f(z) = \frac{1}{2i}\log\left(\frac{1+iz}{1-iz}\right)$$

Verificar que f é holomorfa em $\mathbb{C}\setminus F$, onde $F = \{it,\ t \in \mathbb{R},\ |t| > 1\}$. De acordo com o item anterior conclua que

$$f(z) = \frac{1}{2i}\log(1+iz) - \log(1-iz) \qquad \text{se } z \notin F$$

Concluir que $f(z)$ é um prolongamento analítico da função f dada por

$$f(z) = z - \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} - \cdots = \sum_{n\geqslant 0}(-1)^n\frac{z^{2n+1}}{2n+1}, \qquad |z| < 1$$

Deduzir que para t real em $(-1,1)$, $f(t) = \arctan t$. Conclua que $\tan(f(z)) = z$, $z \in \mathbb{C}\setminus F$ (cf. exercício 12 Parte A, Lista 3). $f(z)$ é o ramo principal de $\arctan z$.

22) Considere a série

$$f(z) := \sum_{0}^{\infty}\frac{z^n}{(n+1)(n+2)(n+3)}$$

a) Mostre que $f(z)$ é analítica no disco aberto $|z| < 1$.

b) Mostre que $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^2\,(zf(z))'\right]$ pode ser escrita em termos de funções analíticas elementares no anel $0 < |z| < 1$. Daí escreva $f(z)$ explicitamente usando funções conhecidas.

23) Verifique (ou obtenha) os desenvolvimentos de Taylor das funções abaixo , justificando a convergência (raio e disco de convergência) em cada caso. Discuta convergência normal.

a) Este exercício é para ser feito por dois métodos. Obtenha via o método do produto de séries (relação de recorrência entre os coeficientes) e também pelo método das frações parciais o seguinte:

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-2z\cos\theta+z^2} &= \sum_0^\infty \frac{\mathrm{e}^{(n+1)i\theta}-\mathrm{e}^{-(n+1)i\theta}}{\mathrm{e}^{i\theta}-\mathrm{e}^{-i\theta}}z^n\\ &= \frac{1}{\sin\theta}\sum_0^\infty z^n\sin(n+1)\theta, \qquad |z|<1\end{aligned}$$

b) Exiba as séries abaixo escrevendo uma expressão numa "forma fechada" ($s \in \mathbb{R}$)

$$\sum_{n\geqslant 0} z^n \cos ns$$
$$\sum_{n\geqslant 0} z^n \sin ns$$

c) Exiba o desenvolvimento de Taylor na origem das funções $f(z)$ abaixo, determinando o raio de convergência das respectivas séries

$$f(z) = \ln(1+z+z^2+z^3+z^4)$$
$$f(z) = \ln(1+2z+2z^2+2z^3+z^4)$$

Sugestão: procure fatorar os polinômios envolvidos no argumento do log.

d) Escreva a série abaixo como soma de duas funções elementares ("closed form")

$$\sum_0^\infty \frac{z^{4n}}{(4n)!}$$

Sugestão: Procure encontrar duas funções conhecidas cuja soma dá a série. Ou ainda, verifique que a série satisfaz uma equação diferencial resolvendo-a.

* * *

Nota cultural matemática

- Considere a *série binomial*

$$b_\sigma(z) := \sum_0^\infty \binom{\sigma}{n} z^n$$

onde

$$\binom{\sigma}{0} := 1 \qquad \binom{\sigma}{n} := \frac{\sigma(\sigma-1)\cdots(\sigma-n+1)}{n!}$$

ou seja

$$b_\sigma(z) = 1 + \sigma z + \frac{\sigma(\sigma-1)}{2} + \cdots$$

Note que b_σ é holomorfa na bola unitária aberta centrada na origem, já que o raio de convergência da série que define b_σ é igual a 1. Note que $b_{-1} = \dfrac{1}{1+z}$, $|z| < 1$. Vale a fórmula de multiplicação :

$$(1+z)b_{\sigma-1} = b_\sigma$$

Infire-se que

$$b'_\sigma(z) = \sigma b_\sigma/(1+z)$$

Seja $\lambda(z) := \displaystyle\sum_1^\infty \frac{(-1)^{n-1}z^n}{n}$. Note que

$$b_\sigma(z) = \mathrm{e}^{\sigma\lambda(z)}, \qquad |z| < 1$$

Vale a fórmula de Abel-Newton

$$(1+z)^\sigma = \sum_0^\infty \binom{\sigma}{n} z^n, \qquad \forall \sigma \in \mathbb{C}, \quad |z| < 1.$$